

Sélection pour présentation renc 2023 Salle SM05 2023



[Agaricus campestris](#)

Chapeau : 6-10 cm, blanchâtre, lisse, fibrilleux-soyeux.

Lames : libres, **rose vif**. Sporée brun pourpre.

Stipe : 8 x 1(2) cm, blanc, aminci à la base. Anneau **fugace**.

Chair : blanche.

Odeur : agréable

Saveur :

Habitat : dans les prés.

Alcool à 90° sur la cuticule = **nulle ou non jaune** Schaeffer sur le chapeau = **positive** TL4 sur la cuticule = **nulle** (concerne tous les Agarics rougissants)



[Agaricus xanthodermus](#)

Chapeau : 5-10 cm, blanc soyeux, forme trapézoïdale, **jaune vif au frottement**.

Lames : blanches, roses puis brun noirâtre, libres. Sporée brun pourpre.

Stipe : 10 x 1-2, bulbeux, marginé, **très jaunissant à la base** (coupe).

Chair : très jaunissante dans la base du pied

Odeur : **odeur d'iodoforme**.

Saveur :

Habitat : dans les prés.

Alcool à 90° sur la cuticule = **jaune de chrome** (spécifique du groupe toxique Xanthoderma) Schaeffer sur le chapeau = **négative** TL4 sur la cuticule = **rose** (concerne tous les Agarics jaunissants)



[Amanita phalloides](#)

Chapeau : 5-15 cm, jaune verdâtre, vergeté de **fibrilles radiales**. Marge lisse.

Lames : **blanches**, libres. Sporée blanche.

Stipe : 7-15 x 1-2 cm, blanchâtre, chiné en zig-zag de verdâtre, bulbeux. Anneau membraneux strié. **Volve membraneuse blanche**.

Chair : blanche.

Odeur : nulle ou de rose fanée

Saveur : douce

Habitat : sous feuillus et conifères, surtout en **milieu acide**.

Acide sulfurique sur les lames = **lilas violet-pâle** TL4 sur toutes les parties = **nulle** jusqu'à 1200m



[Amanita rubescens](#)

Chapeau : 10-15 cm, crème rosâtre à brun vineux, verrues grisâtres. Marge lisse.

Lames : blanches, +/- tachées de rose. Sporée blanche.

Stipe : 8-15 x 1-4 cm, blanchâtre à rosé vineux, bulbeux. Anneau membraneux, strié. Volve subnulle, grisâtre

Chair : blanche rougissant à l'air.

Odeur : faible

Saveur : douce, de radis

Habitat : sous feuillus et conifères.

Acide sulfurique par trempage des lames = rose pâle



[Armillaria mellea](#)

Chapeau : 4-10 cm, mamelonné, de couleur très variable dans les jaune brun, +/- couvert au centre de squamules brunes.

Lames : arquées, décurrentes par un filet, blanches à crème. Sporée blanchâtre.

Stipe : fasciculés portant un anneau pelucheux et membraneux blanc, jaune au-dessous; rhizomorphes spectaculaires en long cordonnets noirs.

Chair : mince, ferme, coriace, ligneuse dans le pied, blanchâtre à reflets carnés.

Odeur : légère de moisi, peu agréable

Saveur : douce puis astringente après mastication prolongée

Habitat : en touffes, de l'été jusqu'à la fin de l'automne, à la base des troncs ou des souches de feuillus, sur les racines, souvent au pied des arbres fruitiers, plus rarement sur conifères.



[Aureoboletus gentilis](#)

Chapeau : 2-5 cm, visqueux par temps humide, typiquement brun-rose, mais aussi crème rosâtre et même blanchâtre.

Tubes : jaune vif. Pores : assez amples, jaune d'or vif.

Stipe : 3-7 x 0,4-1,5 cm, jaune pâle ou jaune vif, puis envahi de roussâtre ; base souvent un peu effilée.

Chair : blanche dans le chapeau et le haut du pied, rouge sous la cuticule, jaune dans le bas du pied.

Odeur : faible mais agréable, un peu fruitée

Saveur : douce dans la chair et salée sur la viscosité du chapeau

Habitat : sous différents feuillus ; peu exigeant quant au sol.



[Aureoboletus moravicus](#)

Chapeau : 5-7(9) cm, convexe, d'un brun jaunâtre terne, sec.

Tubes : subdécurrents, jaunes immuables. Pores moyens, jaune pâle.

Stipe : 12-15 x 0,8-1 cm, élancé, fusiforme, jaune pâle, un peu floconneux.

Chair : ochracé pâle, immuable.

Odeur :

Saveur :

Habitat : Feuillus



[Chalciporus amarellus](#)

Chapeau : 2-6 cm, crème ochracé à brun jaune, un peu rosé au bord, revêtement finement velouté, un peu lubrifié par l'humide.

Tubes : rose framboise, rose carminé puis brun cuivré, légèrement décurrents. Pores concolores aux tubes, immuables, irréguliers, plus serrés vers la marge. Sporée brun ochracé.

Stipe : 2-6 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre à jaunâtre, base jaune vif

Chair : blanchâtre à jaune à la base.

Odeur : faible

Saveur : un peu amarescente à un peu piquante

Habitat : sous conifères, sur sol calcaire.



[Chalciporus piperatus](#)

Chapeau : 2-8 cm, brun jaune à brun rougeâtre avec des tons cuivrés, finement velouté puis lisse et luisant, visqueux par l'humide.

Tubes : brun jaune à brun rouille, décurrents par un filet. Pores amples et irréguliers, plus serrés vers la marge, concolores. Sporée brun rouille.

Stipe : 3-7 x 0,5-1 cm, souvent courbé, concolore, fibrilleux, base jaune vif.

Chair : jaune rosâtre, jaune dans le pied, jaune vif à la base. Odeur faible, saveur très poivrée.

Odeur : faible

Saveur : très poivrée.

Habitat : surtout sous épicéas, parfois sous feuillus. Commun.



[Clitocybe nebularis](#)

Chapeau : 6-15 (30) cm, charnu, conique puis longtemps convexe, centre bombé obtus, étalé-déprimé avec l'âge, d'un **gris jaunâtre** particulier, cuticule. séparable.

Lames : assez serrées, longtemps subadnées, **faciles à séparer**, crème à jaunâtres.

Stipe : 8-15 x 2-4 cm, + pâle que le chapeau un peu en **massue**, base agglomérante

Chair : blanche

Odeur : de pleurote, **peu agréable** à la langue

Saveur :

Habitat : en groupe, en rond de sorcière, ou en ligne, sous feuillus ou sous conifères, en automne.

Phenol à 5% sur la chair = **lentement brunâtre à chocolat**



[Cortinarius herculeus](#)

Chapeau : 5-20(25) cm, visqueux, beige crème, parfois avec un reflet lilas, puis beige roussâtre, avec parfois des restes abondants de voile blanc pouvant former une couronne au bord.

Lames : blanches ou bleu lilas, puis beiges et enfin brun rouille.

Stipe : 9-15 x 2-5 cm, blanchâtre, avec des bracelets de voile +/- abondants.

Chair : blanche

Odeur : de chocolat chez les très jeunes exemplaires, puis exacerbée et désagréable de terre

Saveur : douce

Habitat : exclusivement lié aux Cèdres



[Cortinarius praestans](#)

Chapeau : **15-25 cm**, puissant, convexe, lubifié. Marge enroulée, ridée, cannelée à macules blanches, **châtain violacé à chocolat**.

Lames : serrées, étroites, grisâtres à +/- bleutées violacé. Sporée brune.

Stipe : 10-20 x 2-5 cm, robuste à gros bulbe, blanc à bracelets bleu violeté puis ochracé pâle. **Cortine abondante, soyeuse**.

Chair : **épaisse, très ferme, blanche**.

Odeur : faible

Saveur : douce

Habitat : bois de feuillus. (calcicole).



[Craterellus cinereus](#)

Chapeau : 2-4 cm, gris brun, ombiliqué, percé au centre, fibrilleux.

Hymenium : **plis décourants** gris blanchâtre à gris cendré. Sporée blanchâtre.

Stipe : 2-5 x 0,3-0,5cm, cylindrique, creux.

Chair : mince

Odeur :

Saveur : douce

Habitat : châtaigniers, hêtres, chênes.



[Cystoderrella adnatifolia](#)

Chapeau : 1,5-4 cm, brun-rouge, granuleux, avec des flocons de voile blancs.

Lames : émarginées, blanchâtres. Sporée blanche.

Stipe : 2-5 x 0,3--0,8 cm, concolore au chapeau, plus ou moins masqué par un abondant voile blanc formant armille.

Chair : de couleur crème

Odeur : faible

Saveur : douce

Habitat : dans les bois de conifères ou de feuillus jusqu'à 2000 mètres.



[Entoloma sinuatum](#)

Chapeau : 8-15(22) cm, charnu ou largement mamelonné, à marge enroulée, revêtement glabre, **crème jaunâtre à café au lait clair**, souvent un peu marbré, prumineux ou vergeté.

Lames : typiquement **jaunâtres puis saumonées**.

Stipe : 10-15x1-3 cm, **blanchâtre**, fibrilleux.

Chair : blanche et ferme

Odeur : forte de **farine fraîche**

Saveur :

Habitat : feuillus argilo-calcaire.



[Hebeloma porphyrosporum](#)

Chapeau : 1-5 cm, visqueux puis sec, blanc à beige rosé.

Lames : échancrées, **rose violet puis brun-rose**

Stipe : 3-9 x 0,2-1 cm, blanchâtre, **floconneux-pruineux surtout au sommet.**

Chair : blanche

Odeur : un peu fruitée ou de purée de châtaigne

Saveur : douce puis amère

Habitat : surtout sous **chênes**, mais aussi sous pins, en **relation avec des os de mammifères** ; surtout dans les régions méditerranéennes.



[Hygrophorus arbustivus](#)

Chapeau : 6-8 cm, fibrilleux à vergeté, marge mince et + blanchâtre, **couleur jaune fauve à brun roussâtre ou rosâtre.**

Lames : espacées, décurrentes, blanches. Sporée blanche.

Stipe : 6 x 0,8 cm, blanc, sommet furfuracé, **généralement sec.**

Chair : pâle un peu jaunissante.

Odeur :

Saveur :

Habitat : feuillus (hêtraies), tardif.



[Hygrophorus camarophyllus var. atramentosus](#)

Chapeau : 7-12 cm, convexe puis plat, sec et fibrilleux radialement, gris bleuté noirâtre.

Lames : arquées, subdécurrentes, blanches.

Stipe : jusqu'à 10 x 2 cm, un peu plus pâle.

Chair : blanche ou grisâtre.

Odeur :

Saveur :

Habitat : forêts mêlées. Calcicole



Hygrophorus chrysodon

Chapeau : 3-8 cm blanc taché de **jaune vif à la marge**.

Lames : blanches, espacées, un peu décurrentes. Sporée blanche.

Stipe : blanc **ponctué de jaune** au sommet, faiblement visqueux puis sec.

Chair : blanche

Odeur : faible désagréable

Saveur : douce

Habitat : feuillus calcaires thermophiles mais aussi sous conifères, en automne.

Potasse ou soude à 20% sur la cuticule = **jaune d'or immédiat** Potasse ou soude à 20% sur le pied ou le chapeau = **jaune puis orangé**



Hygrophorus russula

Chapeau : 6-15 cm taché de rose vineux, un peu visqueux par temps humide.

Lames : blanches, plus ou moins décurrentes, **relativement serrées** pour le genre, progressivement tachées de vineux, sporée blanche.

Stipe : blanc, plus ou moins taché lui aussi de vineux.

Chair : **blanche**

Odeur : faible

Saveur : parfois un peu amère suivant le milieu dans lequel il se trouve

Habitat : sous **feuillus**, plutôt sur sol calcaire en automne.

Amoniaque sur la chair = **jaune verdâtre** Potasse ou soude à 20% sur la chair = **jaune verdâtre**



Lactarius chrysorrheus

Chapeau : 5-8 cm, convexe puis vite déprimé, **zones concentriques oranges et rosâtres**, marge enroulée.

Lames : crème orangé pâle, se **tachant de roussâtre**.

Stipe : 3 - 6 x 0,8 -1,5 cm, subégal ou renflé à la base, +/- bosselé, ferme, plein puis creux, nu ou scrobiculé, **pruineux, subconcolore** au chapeau.

Chair : blanche, ferme, jaunissant par le lait, **latex blanc puis jaune d'or en une minute, abondant, acre**.

Odeur : faible

Saveur : acre

Habitat : surtout dans les bois clairs de **feuillus**, sous chênes, hêtres ou châtaigniers.



Lactarius decipiens

Chapeau : 2 à 6 cm de diamètre, convexe puis étalé à déprimé ou cyathiforme, **papillé**, hygrophane, non zoné, mat, ocre **rosâtre pâle** à rouge brunâtre, sec, givré-pruineux, souvent taché-guttulé. Marge parfois ondulée, unie ou ridée-cannelée.

Lames : assez serrées, inégales, adnées-uncinées à subdécurrentes, minces, pâles puis **lavées de crème incarnat**. Arête concolore, entière, aiguë.

Stipe : 3 - 6 x 0,5 - 1 cm, **peu régulier, bosselé** ou comprimé, farci-creux, **subconcolore** au chapeau, **pruineux**.

Chair : cotonneuse, élastique, **crème alutacé** à roux incarnat. Latex **peu abondant**, séreux, **blanchâtre** puis **jaune sulfurin**

Odeur : de **pélargonium**

Saveur : âcre et **amère**.

Habitat : sous feuillus, surtout sous **charmes**.



Lactarius serifluus

Chapeau : 2 à 5 cm de diamètre, **brun rougeâtre** et +/- **orangé** vers la marge, creusé au centre ou un peu mamelonné, à cuticule non séparable.

Lames : **subdécurrentes**, **crème rosé** à roussâtre pâle, assez serrées. Arête concolore, glabre.

Stipe : 3 - 5 x 0,3 - 0,5 cm, **subconcolore** au chapeau ou plus foncé à la base, subcylindrique, glabre ou un peu tomenteux sous la loupe.

Chair : **crème ochracé**, assez ferme mais peu épaisse. Latex **aqueux**, **peu abondant**, opalescent, **non jaunissant**, même sur le mouchoir.

Odeur : faible de **feuille de lierre** ou de **punaise**, non de chicorée

Saveur : **douce**.

Habitat : dans les **bois mêlés**, souvent sous **chênes** et **châtaigniers**, en bordure des chemins ou sur les talus.



Lepista saeva

Chapeau : 6-12cm, conv puis aplani, **beige grisâtre** puis beige brunâtre. Marge enroulée chez le jeune.

Lames : beige clair, **très faciles à séparer**. Sporée crème.

Stipe : 3-8x1,2-2,5cm, court, **typiquement pruineux sur fond améthyste**.

Chair : blanche

Odeur : aromatique

Saveur : douce.

Habitat : pâtures, lisières de forêt.



[Pholiota lenta](#)

Chapeau : 3-8 cm, visqueux beige ochracé, disque + sombre, squames pâles.

Lames : serrées, beige jaunâtre pâle. Sporée brun rouillé.

Stipe : 3-10 x 1 cm, subbulbeux, floconneux de blanc sous la cortine, pâle à brunâtre par le bas.

Chair : pâle.

Odeur : faible

Saveur : douce

Habitat : sous feuillus et conifères, débris ligneux.



[Rubroboletus dupainii](#)

Chapeau : 6-12 cm, rouge, rouge écarlate vif devenant ocre brunâtre en vieillissant, brillant, un peu visqueux par l'humide, revêtement séparable.

Tubes : jaunes puis jaune olivâtre. Pores jaune orangé à rouge vif, jaunes à la marge, bleuissant au toucher.

Stipe : 4-10 x 3-6 cm, jaune couvert de ponctuations rougeâtres, réseau seulement au sommet.

Chair : jaune pâle, peu bleuissante, rosée sous le revêtement, rouge vineux à la base.

Odeur : faible fruitée

Saveur : douce

Habitat : surtout sous chênes et châtaigniers.



[Russula sanguinaria](#)

Chapeau : 3-12 cm, rouge sang à rouge cerise, puis décoloré en plage crème, parfois entièrement décolorée (var. confusa). Cuticule non séparable, viscidule.

Lames : blanchâtres, puis crème foncé, subdécurrentes. Spores ocre pâle.III

Stipe : 3-7x1-2,5 cm, dur, blanc +/- lavé de rose-rouge, se tachant de jaune au frottement.

Chair : blanche, jaunissante, rose sous la cuticule, dure.

Odeur : fruitée faible

Saveur : âcre.

Habitat : sous pins (sylvestres) parfois sous mélèzes.

Sulfate de fer sur la chair = rose pâle Phenol sur la chair = brun



Russula torulosa

Chapeau : 4-10 cm, charnu, **viscidule**, bossu, rouge vineux, olivacé.

Lames : assez serrées, fourchues près du stipe, blanches à crème pâle. Sporée **ocre pâle**. III .

Stipe : 5-8 x 1-3 cm, **trapu, dur, rose lilacin**, base blanchâtre.

Chair : blanche, ferme, rougeâtre sous la cuticule

Odeur : **de pomme**.

Saveur : **âcre**

Habitat : sous **pins**. Calcaire.

NH3 sur la chair = **nul**, Sulfate de fer sur la chair = **rose**, Gaïac sur la chair = **lente, bleu azur**, Phenol sur la chair = **brun**



Russula xerampelina

Chapeau : 4-15 cm, rouge pourpre vif, centre noirâtre, **viscidule**, cuticule adnée.

Lames : échancrées, sublardacées, blanches à crème puis ochracées. Sporée **ocre foncé** III

Stipe : 4-6-(8) x 1,5-3-(4) cm, ridé, réticulé, clavé, ferme, **rose à rouge, brunissant**.

Chair : blanchâtre à ochracée

Odeur : de crustacés à la base du stipe.

Saveur : **saveur douce**,

Habitat : sous **pins**.

Sulfate de fer sur la chair = **vert obscur** Gaïac sur la chair = **bleu vert** Eau anilinée = **rouge brique**



Schizophyllum commune

Chapeau : 2-5 cm ; en éventail ou conchoïde (plus ou moins en forme de coquillage), fortement laineux puis strigieux (muni de poils raides), blanc grisâtre par temps sec, gris brunâtre par temps humide ; marge mince, festonnée, poilue.

Lames : fausses lames, radiales, fendues dans le sens de la longueur (M.Bon précise : "aspect de gare de triage vue d'avion") de couleur beige rosâtre à gris pourpre. Sporée crème ochracé rosâtre.

Stipe : nul.

Chair : pâle, coriace, brune à la coupe. Saveur douce, odeur faible. **On ne doit pas sentir ce champignon qui peut dans certains cas rares se développer sur des tissus humains.**

Odeur :

Saveur :

Habitat : sur toutes sortes de bois morts.



[Tricholoma bresadolatum](#)

Chapeau : 5-10 cm, convexe, non mamelonné, lobé ondulé, **squames fibrilleuses concentriques gris ardoisé sur fond argenté.**

Lames : échancrées, grisâtres, arête +/- ponctuée de noirâtre; Sporée blanche.

Stipe : 5-8 x 1-2,5 cm, cylindrique, **couvert de squames gris ardoisé sur fond argenté.**

Chair : blanche à grisâtre

Odeur : faible

Saveur : amère puis acre.

Habitat : s/s feuillus, chênes en particulier, automne, **espèce thermophile.**

Gaïac sur la cuticule ou le pied? = **rapide ou bleu vif**



[Tricholoma equestre](#)

Chapeau : 4-10 cm, convexe, jaune vif, à centre sec orné de squamules brunes.

Lames : échancrées, jaune de soufre. Sporée blanche.

Stipe : 6-8 x 1-1,5 cm, jaune.

Chair : pâle, jaune dans le cortex du pied.

Odeur : faible de farine

Saveur : agréable plutôt farineuse ou de noisette.

Habitat : sous conifères et sous feuillus.



[Tricholoma pardinum](#)

Chapeau : 6-15 cm, charnu, submamelonné, **squames concentriques**, gris brun à gris noirâtre, marge enroulée.

Lames : échancrées, serrées, blanchâtres à crème. Sporée blanche.

Stipe : 5-10 x 2-4 cm, rob., ventru, blanchâtre puis brunâtre, sublisce pâle.

Chair : pâle

Odeur : subfarineuse puis désagréable.

Saveur :

Habitat : sous hêtraies, sapinières. Calcicole.

TL4 sur le pied = **violacé lilas** Gaïac sur la cuticule ou le pied? = **rapide ou bleu vif**



Grand Bois de Poligny
Devilay / Champour (55)
19 septembre 2020
Photo L. Guilberteau ©

[Tricholoma saponaceum](#)

Chapeau : 6-12 cm typiquement gris olivâtre, plus ou moins mélé de jaune, marge plus claire. **Lisse**

Lames : échancrées, blanches à reflets olivâtres. Sporée blanche.

Stipe : blanc souvent rosissant et atténué à la base.

Chair : blanche

Odeur : de savon

Saveur :

Habitat : ubiquiste, en automne.

TL4 sur la cuticule ou le pied? = **violacé lilas**